

SISTEMA NERVOSO

COSCIENZA

Soporosa: La p.a. non è cosciente ma lo stato di incoscienza recede agli stimoli verbali.

Non responsiva: La p.a. non risponde né a stimoli verbali né a stimoli dolorosi.

ORIENTAMENTO

Disorientata: La p.a. non è orientata rispetto a sé e/o agli altri e/o nel tempo e/o nello spazio.

Confusa: La p.a. presenta difficoltà all'attenzione, può ripetere di continuo alcune frasi, il pensiero appare frammentato e disorganizzato.

EMOZIONI

Ansia moderata/preoccupazione: La p.a teme di non riuscire ad affrontare un evento.

Ansia marcata/agitazione: La p.a. oltre a temere di non riuscire ad affrontare un evento manifesta segni clinici quali per esempio: tachicardia, cardiopalmo, sudorazione, ipercinesia.

Ansia severa/paura: La p.a. oltre a temere di non riuscire ad affrontare un evento manifesta segni clinici quali per esempio: marcati segni di agitazione, tremori, sensazione di morire, dispnea.

Depressione: La p.a. manifesta segni clinici quali per esempio: malinconia, perdita di interesse, inappetenza, astenia.

APPARATO RESPIRATORIO

RITMO RESPIRATORIO

Dispnea lieve/moderata: La p.a. avverte disagio respiratorio senza manifestazioni cliniche obiettivabili.

Dispnea severa: La p.a. presenta fatica respiratoria con segni clinici obiettivabili dall'operatore quali per esempio: cianosi, rumorosità, agitazione, tachicardia.

APPARATO DIGERENTE

FUNZIONI DI DEFECAZIONE

Alvo chiuso ai gas e alle feci: La p.a. presenta un addome globoso, aumento o assenza di peristalsi, senza emissione di gas e feci.

APPARATO URINARIO

CONTINENZA URINARIA

Ritenzione urinaria: La p.a. non riesce ad urinare spontaneamente e deve essere supportata, può presentare o meno globo vescicale.

APPARATO TEGUMENTARIO

STATO DELLA CUTE

Cute con lesione da pressione di I stadio: La p.a. presenta un'area di eritema marcato che non scompare alla digitopressione.

Cute con lesione da pressione di II stadio: La p.a. presenta una lesione cutanea superficiale all'epidermide e/o al derma, si manifesta sotto forma di abrasione o vescicola.

Cute con lesione da pressione di III stadio: La p.a. presenta una lesione con perdita di sostanza a tutto spessore in cui la lesione e la necrosi progrediscono interessando il tessuto sottocutaneo fino alla fascia muscolare, senza oltrepassarla, con o senza sottominature dei bordi.

Cute con lesione da pressione di IV stadio: La p.a. presenta una lesione che si estende oltre la fascia profonda interessando muscoli, tendini, strutture capsulari ed osso.

SISTEMA EMATOLOGICO E IMMUNOLOGICO

SANGUINAMENTI: APPARATO GASTRO-ENTERICO SUPERIORE

Vomito a fondo di caffè: La p.a. emette vomito color bruno che ricorda il liquido presente sul fondo di una tazzina dopo aver bevuto il caffè.

Ematemesi: La p.a. emette vomito con presenza di sangue vivo.

SANGUINAMENTI: APPARATO GASTRO-ENTERICO INFERIORE

Sanguinamento lieve/moderato: La p.a. presenta tracce di sangue vivo con frequenza costante e/o intermittente.

Sanguinamento in atto evidente e significativo: La p.a. presenta una perdita costante e cospicua di sangue.

Rettorragia: La p.a. presenta emissione di sangue rosso vivo o più scuro dall'ano, isolato o commisto a feci e/o muco.

SANGUINAMENTI: APPARATO RESPIRATORIO SUPERIORE

Sanguinamento lieve/moderato: La p.a. presenta tracce di sangue vivo con frequenza costante e/o intermittente.

Sanguinamento in atto evidente e significativo: La p.a. presenta una perdita costante e cospicua di sangue.

Epistassi: La p.a. presenta fuoriuscita di sangue rosso vivo dal naso, che può interessare una o entrambe le narici.

SANGUINAMENTI: APPARATO RESPIRATORIO INFERIORE

Emoftoe: La p.a. presenta emissione con la tosse di escreato con striature di sangue proveniente dalle vie respiratorie.

Emottisi: La p.a. presenta espulsione di sangue vivo con la tosse proveniente dalle vie respiratorie.

**SANGUINAMENTI:
APPARATO URINARIO**

Sanguinamento lieve/moderato: La p.a. presenta tracce di sangue vivo con frequenza costante e/o intermittente (urine con colore lavatura di carne).

Sanguinamento in atto evidente e significativo: La p.a. presenta una perdita costante e cospicua di sangue (urine con colore francamente rossastro e con presenza di coaguli)..

Ematuria: La p.a. presenta emissione di sangue nelle urine.

**SANGUINAMENTI:
APPARATO GENITALE**

Sanguinamento lieve/moderato: La p.a. presenta tracce di sangue vivo con frequenza costante e/o intermittente.

Sanguinamento in atto evidente e significativo: La p.a. presenta una perdita costante e cospicua di sangue.

Metrorragia: La p.a. presenta emissione di sangue vivo dalla vagina di origine uterina che si manifesta nel periodo intermestruale oppure in un periodo in cui non dovrebbero verificarsi mestruazioni (gravidanza, prepubertà, postmenopausa).

DOLORE

SENSAZIONE DI DOLORE

Scala analogica visiva VAS: Rappresentazione visiva dell'ampiezza del dolore che la p.a. crede di avvertire. L'ampiezza è rappresentata da una linea lunga 10 cm. con o senza tacche in corrispondenza di ogni cm.. Una estremità (0) indica l'assenza di dolore, mentre l'altra rappresenta il peggior dolore immaginabile. La scala viene compilata dalla p.a. al quale viene chiesto di tracciare un segno sulla linea che rappresenti il dolore provato.

ALIMENTAZIONE

MANGIARE

SNG: Sondino naso-gastrico.

PEG: Gastrostomia endoscopia percutanea.

PEJ: Digiunostomia endoscopia percutanea.

ASSUNZIONE DI FARMACI E SOSTANZE

**FARMACI:
TERAPIA PER VIA ENTERALE**

SNG: Sondino naso-gastrico.

PEG: Gastrostomia endoscopia percutanea.

PEJ: Digiunostomia endoscopia percutanea.

UTILIZZO DI PRODOTTI E TECNOLOGIE SANITARIE

MEDICAZIONI LESIONI DA PRESSIONE

Cute con lesione da pressione di I stadio: La p.a. presenta un'area di eritema marcato che non scompare alla digitopressione.

Cute con lesione da pressione di II stadio: La p.a. presenta una lesione cutanea superficiale all'epidermide e/o al derma, si manifesta sotto forma di abrasione o vescicola.

Cute con lesione da pressione di III stadio: La p.a. presenta una lesione con perdita di sostanza a tutto spessore in cui la lesione e la necrosi progrediscono interessando il tessuto sottocutaneo fino alla fascia muscolare, senza oltrepassarla, con o senza sottominature dei bordi.

Cute con lesione da pressione di IV stadio: La p.a. presenta una lesione che si estende oltre la fascia profonda interessando muscoli, tendini, strutture capsulari ed osso.

SNG

SNG: Sondino naso-gastrico.

PEG - PEJ

PEG: Gastrostomia endoscopia percutanea.

PEJ: Digiunostomia endoscopia percutanea.

VENTILAZIONE ASSISTITA

BPAP: Bi-Level Positive Airway Pressure (Ventilazione a pressione positiva intermittente).

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure (Ventilazione a pressione positiva continua).

EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI

DIMISSIONE

RAF: Residenza Assistenziale Flessibile.

RAB: Residenza Assistenziale di Base.

RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale.