

ABSTRACT

INTRODUZIONE E OBIETTIVI : *Il trattamento del dolore severo nel corso di malattie neoplastiche rappresenta un grave problema di salute pubblica in tutto il mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda da tempo il trattamento tempestivo ed efficace del dolore cronico severo auspicando che possa essere garantita a tutti i malati un'adeguata assistenza durante le fasi terminali della loro malattia. Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di valutare l'efficacia della terapia del dolore, nel paziente neoplastico.*

MATERIALI E METODI : *per svolgere questo lavoro si è condotta un'indagine quanti-qualitativa in un campione di 40 persone affette da patologia neoplastica in trattamento farmacologico per il controllo del dolore. Lo strumento utilizzato per questa indagine è una scheda di raccolta dati con all'interno la Scala di Valutazione del Dolore (VAS) sottoposta ai pazienti in due momenti diversi, prima del trattamento terapeutico e dopo.*

RISULTATI: *Dopo aver raccolto tutti i dati ed averli elaborati, si evince che la terapia del dolore è molto importante ed è per una percentuale di pazienti molto efficace e inoltre è un ottimo strumento per migliorare la qualità di vita del paziente.*

PAROLE CHIAVE: *Dolore oncologico, Terapia del dolore, assistenza infermieristica*

ABSTRACT

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: *The treatment of severe pain during neoplastic diseases is a serious public health problem worldwide. The World Health Organization (WHO) recommends long been the timely and effective treatment of severe chronic pain hoping that it can be guaranteed to all patients an adequate care during the terminal stages of their illness. This work will aim to assess the effectiveness of the treatment of pain in the patient neoplastic.*

MATERIALS AND METHODS: *To carry out this work was conducted a quantitative and qualitative survey in a sample of 40 people suffering from neoplastic disease in medication to control pain. The instrument used for this survey is a collection of data within the Scale of Pain Assessment (SEA) subjected to patients in two different moments before and after therapy treatment.*

RESULTS: *After gathering all the data and have developed, it appears that the treatment of pain is very important and it is for a percentage of patients very effective and is also a great way to improve the quality of life of the patient.*

KEY WORDS: *cancer pain, pain therapy, nursing*